

Заболеваемость ОРИ. Вакцинация против гриппа.

По данным проводимого мониторинга уровень заболеваемости ОРИ в Беларуси по состоянию на 04.12.2017 г. ниже на 3,8%, чем в прошлом году.

В возрастной структуре заболевших 72% случаев приходится на детей.

Заболеваемость обусловлена негриппозными респираторными вирусами (аденовирусами, респираторно-сентициальными и вирусами парагриппа), положительных лабораторных результатов идентификации вирусов гриппа не отмечается.

Аналогичная ситуация по заболеваемости ОРИ наблюдается и в соседних странах. Только отдельные европейские страны сообщают о спорадических случаях и ограниченном распространении гриппа.

Кампания вакцинации против гриппа в Республике Беларусь близится к завершению. По состоянию на 30 ноября 2017 года профилактические прививки от гриппа получили почти 3,7 млн человек, в том числе более 1,7 млн лиц, относящихся к группе высокого риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом (дети от 6 месяцев до 3-х лет, дети и взрослые, страдающие хроническими заболеваниями и беременные), привито более 180 тысяч медицинских работников, более 625 тысяч дошкольников и школьников.

Эпидемиологическая ситуация по ОРИ в настоящее время способствует проведению прививочной кампании.

Обращаем внимание, что граждане, которые не успели по каким-либо причинам защитить себя или своих близких от гриппа, еще имеют возможность сделать профилактическую прививку в организациях здравоохранения страны.